

Личный мед.подсумок			
№	Наименование	Количество	Порядок применения и пр.
<b>Ампульница сделана из АИ-2</b>			
1.	Кетанал	3 амп.	По 1 амп. На 12 часов В особом случае 2 амп. с интервалом
2.	Анальгин	1 амп.	
3.	Дексаметазон	2 амп.	Отек мозга 10мг. Шок -20мг.Сустав 0.4-4мг. Аллерг. 4-8мг
4.	Кордиамин 25% раствор	1 амп.	По 1 мл. 3 раза в сутки В/М
5.	Адреналин	1 амп.	Глубокий шок
6.	Этамзилат	1 апм.	Препятствует выходу крови из тканей
<b>Перевязочные и кровоостанавливающие средства:</b>			
1.	CELOX	Комплект	(Бинт, Гранулы, Апликатор) В особо тяжелом случае
2.	Бинт эластичный 10х5	1 шт.	
3.	Лейкопластырь рулонный 3х5м	1 уп.	
4.	Салфети «АктивТекс» набор	1 из 3 шт.	Полить салфетку водой, после на рану по назначению
5.	Спиртовые салфетки	5 шт.	Перед применением инъекций
6.	ИПП	1 шт.	
7.	Пластырь большой квадратный	1 шт.	
8.	Жгут	1 штю	
<b>Средства для глаз и носа:</b>			
1.	Визин	1 тюбик	Если «лупни»)))) в засаде устали
2.	Нафтизин	1 тюбик	Для моего ебаного носа)))
<b>Инструменты и принадлежности</b>			
1.	Шприцы 5 куб.	5 шт.	
2.	Нож специальный для одежды и обуви	1 шт.	
3.	Ножницы для одежды	1 шт	
4.	Зажим	1 шт.	
5.	Шовный материал с иглами	2 компл.	
6.	Маркер	1 шт.	
7.	Химический источник света	1 шт.	